

KULLANMA TALİMATI

ZEPATIER 50 mg/100 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin maddeler:** Her bir film kaplı tablet 50 mg elbasvir ve 100 mg grazoprevir içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum lauril sülfat, vitamin E polietilen glikol süksinat, kopovidon, hipromelloz, mikrokristalin selüloz, mannitol (E421), laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), kroskarmeloz sodyum, sodyum klorür, susuz koloidal silika, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit, triasetin, sarı demir oksit (E172), kırmızı demir oksit (E172), ferroferrik oksit (E172), karnauba mumu.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.***

Bu Kullanma Talimatında :

1. ZEPATIER nedir ve ne için kullanılır?
2. ZEPATIER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ZEPATIER nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ZEPATIER'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZEPATIER nedir ve ne için kullanılır?

- ZEPATIER elbasvir ve grazoprevir adı verilen iki farklı ilaç içerir. Bunların her ikisi de virüslere karşı kullanılan ilaçlardır.
- Film kaplı tabletler bej, oval, bir yüzünde "770" baskılı ve diğer yüzü baskısız olan tabletlerdir. Tablet uzunluğu 21 mm ve genişliği 10 mm'dir.

Tabletler her biri 7 tabletlik iki alüminyum blister içeren iki karton kartta bulunur ve bu iki karton kart da tek bir karton kutu içerisinde ambalajlanmıştır. Her karton kutuda toplam 28 tablet bulunur.

- ZEPATIER yetişkinlerde ve en az 30 kilogram ağırlığında olan 12 yaş ve üzeri çocuklarda uzun süreli hepatit C enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.

Hepatit C karaciğerde enfeksiyona yol açan bir virüstür. Bu ilacın içerisinde bulunan etkin maddeler hepatit C'nin gelişmesi ve kendini kopyalaması için ihtiyaç duyduğu iki farklı proteini bloke ederek etki gösterir. Böylelikle enfeksiyonun vücuttan kalıcı olarak uzaklaştırılması sağlanmış olur.

ZEPATIER bazen ribavirin adı verilen başka bir ilaçla birlikte alınır.

ZEPATIER ile birlikte alacağınız diğer ilaçların Kullanma Talimatlarını da okumanız çok önemlidir. İlaçlarınız hakkında herhangi bir sorunuz olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

2. ZEPATIER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZEPATIER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:

- Elbasvir, grazoprevir veya bu ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine alerjik iseniz (aşırı duyarlılığınız varsa).
- Orta derecede ya da şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa,
- Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız:
 - genellikle tüberküloz için verilen rifampisin.
 - HIV için kullanılan atazanavir, darunavir, lopinavir, sakonavir veya tipranavir.
 - HIV için kullanılan efavirenz veya etravirin.
 - HIV için kullanılan elvitegravir/kobisistat/emtrisitabin/tenofovir disoproksil fumarat veya elvitegravir/kobisistat/emtrisitabin/tenofovir alafenamid.
 - organ nakli reddini durdurmak veya gözler, böbrek, eklemler veya derinin ciddi enflamatuvar hastalıklarının tedavisi için kullanılan siklosporin.
 - pulmoner arteriyel hipertansiyon (akciğerdeki atardamarları etkileyen bir tür yüksek tansiyon) için kullanılan bosentan.
 - esas olarak epilepsi (sara hastalığı) ve nöbetler için kullanılan ilaçlar: karbamazepin veya fenitoin.
 - uyanık kalamayan kişilere yardımcı olmak için kullanılan modafinil.
 - depresyon veya diğer sorunlar için kullanılan bitkisel bir ilaç olan St. John's wort (sarı kantaron otu, *Hypericum perforatum*).

ZEPATIER'i ribavirin ile birlikte alıyorsanız, lütfen ribavirinin Kullanma Talimatındaki "Aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ" bölümünü okuyunuz. Kullanma talimatındaki herhangi bir bilgidem emin olamazsanız, lütfen doktorunuzla veya eczacınızla temas kurunuz.

ZEPATIER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ZEPATIER'i almadan önce sizde aşağıdakiler mevcut ise doktorunuza söyleyiniz:

- Hepatit B virüsü enfeksiyonunuz varsa ya da hepatit B virüsü ile daha önce enfekte olduysanız, bu durumda doktorunuz sizi yakından izlemek isteyebilir.
- Hepatit C için geçmişte herhangi bir ilaç aldysanız.

- Hepatit C dışında herhangi bir karaciğer sorununuz varsa.
- Size karaciğer nakli yapıldıysa.
- Diyabet hastasıysanız. ZEPATIER'e başladıktan sonra kan şekeri seviyelerinizin daha yakından izlenmesine ve/veya diyabet ilacınızın ayarlanmasına ihtiyacınız olabilir. Bazı diyabetli hastalarda ZEPATIER gibi ilaçlarla tedaviye başladıktan sonra kanda düşük şeker seviyeleri (hipoglisemi) gözlenmiştir.
- Başka herhangi bir tıbbi durumunuz varsa.

Kan testleri

Doktorunuz ZEPATIER ile tedavi edilmenizden önce, tedaviniz sırasında ve sonrasında kan testleri yapacaktır. Bu kan testleri sayesinde doktorunuz şunları yapabilecektir:

- ZEPATIER almanızın gerekip gerekmediği ve ne kadar süreyle almanız gerektiğine karar vermek.
- ZEPATIER ile birlikte almanız gereken diğer ilaçlar ve bunların ne kadar süre alınacağı hakkında karar vermek.
- Yan etkileri tetkik etmek.
- Tedavinizin işe yarayıp yaramadığını ve hepatit C'nizin iyileşip iyileşmediğini kontrol etmek.
- Karaciğerinizin ne derece iyi çalıştığını kontrol etmek. Karaciğer sorunlarının aşağıdaki belirtilerinden birini yaşarsanız hemen doktorunuza söyleyiniz: iştah kaybı, bulantı veya kusma, yorgunluk veya güçsüzlük; gözlerinizin beyaz kısımlarında ve derinizde sararma; dışkımda renk değişiklikleri. Sizde bu belirtilerden herhangi biri varsa doktorunuz karaciğerinizin ne durumda olduğunu kontrol etmek amacıyla size kan testleri yapabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde bile olsa, sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

ZEPATIER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Bu ilaç yiyeceklerle birlikte veya yiyecek olmaksızın alınabilir.

Hamilelik

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde ZEPATIER'in etkileri bilinmemektedir. Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzdan tavsiye isteyiniz.

ZEPATIER ile ribavirin kullanımı

ZEPATIER ile birlikte ribavirin alıyorsanız gebe kalmamanız gerekir. Ribavirin anne karnındaki bebeğe çok fazla zarar verebilir. Bu nedenle, sizin veya eşinizin hamile kalma olasılığı varsa cinsel aktivite sırasında hem sizin hem de eşinizin özel önlemler alması zorunludur.

ZEPATIER ile birlikte ribavirin tedavisi sırasında ve tedavi bittikten sonra bir süre için sizin ve eşinizin etkili bir doğum-kontrol yöntemi kullanması zorunludur. Sizin için uygun olan farklı doğum kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşunuz.

Eğer siz veya eşiniz ZEPATIER ile birlikte ribavirin alırken ya da sonraki aylarda hamile kalırsa hemen doktorunuza söyleyiniz.

Ribavirinin Kullanma Talimatında yer alan gebelik ve doğum kontrolü hakkındaki bilgileri çok dikkatli okumanız çok önemlidir. Hem erkeklerin hem de kadımların bu bilgileri okumaları önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız ZEPATIER'i almadan önce doktorunuzla konuşunuz. ZEPATIER'in içerisinde bulunan iki ilacın da anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

ZEPATIER'i ribavirin ile birlikte alıyorsanız, bu ilacın Kullanma Talimatında yer alan "Gebelik" ve "Emzirme" bölümlerindeki bilgileri mutlaka okuyunuz.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilacı aldıktan sonra kendinizi yorgun hissederseniz araç veya makine kullanmayınız.

ZEPATIER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ZEPATIER laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

ZEPATIER'in her bir tableti 69,85 mg sodyum (yemek pişirmenin ana bileşeni/sofra tuzu) içerir, bir yetişkin için önerilen günlük maksimum sodyum alım değerinin %3,5'ine eşdeğerdir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, yakın tarihte kullandıysanız veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bunlara reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel ilaçlar dahildir. Kullandığınız ilaçların bir listesini hazırlayınız ve size yeni bir ilaç verildiğinde listenizi doktora ve eczacıya gösteriniz.

ZEPATIER ile birlikte **almamanız gereken** bazı ilaçlar vardır. "Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız ZEPATIER'i almayınız" başlığının altındaki listeye bakınız:

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

- Mantar enfeksiyonları için kullanılan oral ketokonazol
- Organ nakli reddini önlemek için kullanılan takrolimus
- Kan pıhtılarını önlemek için kullanılan dabigatran
- Rosuvastatin, atorvastatin, fluvastatin, simvastatin veya lovastatin (kan kolesterol düzeyini düşürmek için kullanılan ilaçlar)
- Bazı kanserleri tedavi etmek için kullanılan sunitinib.
- Vitamin K antagonisti olarak adlandırılan varfarin ve diğer benzer ilaçlar kan inceltici olarak kullanılmaktadır. Doktorunuz kanınızın ne kadar iyi pıhtılaştığını kontrol etmek için kan testlerinizin sıklığını arttırmayı gerekli görebilir.

Doktorunuzun bu ilaçlarınızı veya ilaçlarınızın dozunu deęiřtirmesi gerekebilir:

Karacięer fonksiyonunuz hepatit C tedavisi ile dzelebilir ve bu nedenle karacięer tarafından kullanılan dięer ilaları etkileyebilir. Doktorunuzun ZEPATIER tedavisi sırasında, kullandığınız bu dięer ilaları yakından takip etmesi ve ayarlamalar yapması gerekebilir.

Eęer yukarıdakilerden herhangi biri sizin iin geerliyse (veya emin deęilseniz), ZEPATIER’i almadan nce doktorunuzla veya eczacınızla konuřunuz.

Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ZEPATIER nasıl kullanılır?

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya eczacınızın size syledięi řekilde alınız. Emin deęilseniz doktorunuza veya eczacınıza danıřınız. Hepatit C veya bařka bir tıbbi durum iin daha nce bařka herhangi bir ila kullandıysanız ZEPATIER’i almadan nce doktorunuzla veya eczacınızla konuřunuz.

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı iin talimatlar:**

Tavsiye edilen doz yiyeceklerle birlikte veya ayrı olarak **gnde bir kez alınan bir tablettir**. Doktorunuz ZEPATIER’i ka hafta sreyle almanız gerektięini size syleyecektir.

Tableti btn olarak, yiyeceklerle birlikte veya ayrı yutunuz. Tableti iğnemeyiniz, blmeyiniz veya ezmemeyiniz. Tabletleri yutma konusunda sorun yařıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza syleyiniz.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

Bu ila ağız yoluyla alınır.

- **Deęişik yař grupları:**

ocuklarda kullanımı:

ocuklar

ZEPATIER 12 yařından kk ocuklarda kullanılamaz.

Yařlılarda kullanımı:

Yařlı hastalarda (65 yař zerinde) doz ayarlaması nerilmemektedir.

- **zel kullanım durumları:**

Bbrek yetmezlięi

Diyalizden baęımsız olarak bbrek yetmezlięi olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karacięer yetmezlięi

ZEPATIER orta derecede veya ciddi karacięer yetmezlięi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eęer ZEPATIER’in etkisinin ok gl veya zayıf olduęuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza konuřunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZEPATIER kullandıysanız:

ZEPATIER'den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Hangi ilacı almış olduğunuzu doktora gösterebilmek için ilaç kutusunu yanınızda götürünüz.

ZEPATIER'i kullanmayı unutursanız:

Bu ilacın bir dozunu bile atlamamanız önemlidir. Eğer bir dozu almayı unutursanız, ZEPATIER'i almanız gereken zamanın üzerinden ne kadar süre geçtiğini hesaplayınız:

- Dozunuzu almanız gereken zamanın üzerinden 16 saatten az bir süre geçmişse, unutulmuş dozu mümkün olan en kısa zamanda alınız. Bir sonraki dozu normal zamanında alınız.
- Dozunuzu almanız gereken zamanın üzerinden 16 saatten daha fazla bir süre geçmişse, unutulmuş dozu almayınız. Bekleyiniz ve bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZEPATIER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size söylemedikçe bu ilacı almayı bırakmayınız. Tedavi kürünü eksiksiz tamamlamanız çok önemlidir. Böylelikle ilacın hepatit C enfeksiyonunuza karşı en iyi şekilde savaşma olasılığını arttırabileceksiniz.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız var ise, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Her ilaç gibi ZEPATIER de yan etkilere yol açabilir ancak bunlar herkeste görülmez.

Aşağıdaki yan etkilerden birini fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

- Çok yorgun hissetmek (yorgunluk)
- Baş ağrısı

Yaygın:

- Kusacakmış gibi olmak (bulantı)
- Güçsüz veya enerjisiz hissetmek (bitkinlik)
- Kaşıntı
- İshal
- Uyuma güçlüğü (uykusuzluk)
- Eklem ağrısı veya şiş, ağrılı eklemler
- Kabızlık
- Baş dönmesi
- İştah kaybı
- Kolayca öfkelenmek

- Kas ağrıları
- Karın ağrısı
- Saçlarda olağandışı dökülme veya incelme
- Sınırlı hissetmek (anksiyete)
- Depresyon
- Ağız kuruluğu
- Kusma

Yaygın olmayan:

- Karaciğer fonksiyonunun laboratuvar testlerinde anormallikler

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ZEPATIER'in saklanması

ZEPATIER'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Karton kutu ve blister üzerindeki son kullanma tarihinden sonra ZEPATIER'i kullanmayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Nemden korumak için ürünü orijinal ambalajında saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZEPATIER'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi : Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti.
Levent - İstanbul

Üretim yeri : MSD International GmbH
Ballydine, Co. Tipperary, İrlanda

Bu kullanma talimatı 21/06/2022'de onaylanmıştır.